

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

ANTIEMÉTICOS

1. Bromoprida.....10mg
Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral 3 vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições.

Indicações: antiemético.

2. Bromoprida.....10mg
Vitamina B6.....300mg
Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, de 1 a 2 cápsula via oral ao dia.

Indicações: antiemético, em náuseas, vômitos, dispepsias não-ulcerosas.

3. Dicloridrato de buclizina.....50mg
Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, de 1 cápsula via oral de 50mg, 2 a 3 vezes ao dia. Contraindicado na gravidez.

Indicações: náuseas e vômitos, age nos sítios quimiorreceptores medulares, a nível do centro do vômito, no SNC, produzindo efeito antináusea e antiemético.

4. Dimenidrinato.....50mg
Piridoxina (vitamina B6)10mg
Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral 2 a 4 vezes ao dia.

Indicações: antiemético.

5. Domperidona.....10mg
Simeticona.....80mg
Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral 2 vezes ao dia.

Indicações: antiemético.

6. Metoclopramida.....4 mg
 Piridoxina (vitamina B6)50mg
 Veículo qsp.....1 ml
 Mande em frasco com 100ml.

Posologia: a critério do profissional habilitado, crianças de 5 a 14 anos de 2mg a 5mg 3 vezes ao dia.

Indicações: antiemético.

7. Metoclopramida.....5mg a 10mg
 Base para supositório qsp.....1 supositório
 Mande...(nº) supositórios

Posologia: a critério do profissional habilitado, adultos – aplicar 1 supositório (10mg) por via retal, até 3 vezes ao dia; crianças – aplicar 1 supositório (5mg) por via retal, até 2 vezes ao dia.

Indicações: antiemético.

8. Ondansetrona.....8 mg
 Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, náuseas e vômitos após quimioterapia – 1 cápsula 1 a 2 horas antes da quimioterapia seguida de 1 cápsula 3 vezes ao dia; prevenção de náuseas e vômitos pós-operatórios – 2 cápsulas 1 hora antes da cirurgia.

Indicações: náuseas e vômitos após quimioterapia.

9. Ondansetrona.....8 mg
 Água purificada.....20%
 Gel transdérmico PLO qsp.....1 ml
 Mande seringas calibradas com 10ml, sachês monodose ou frasco dosador calibrado (1ml).

Posologia: a critério do profissional habilitado, aplicar de forma tópica 1ml 3 vezes ao dia, nos pulsos e atrás das orelhas.

Indicações: náuseas e vômitos após quimioterapia.

10. Cloridrato de prometazina.....50 mg
 Água purificada.....4%
 Gel transdérmico PLO qsp qsp.....1 ml
 Mande seringas calibradas com 10ml, sachês monodose ou frasco dosador calibrado (1ml).

Posologia: a critério do profissional habilitado, aplicar de forma tópica 0,5ml a 1ml 2 a 3 vezes ao dia ou quando necessário, nos pulsos e atrás das orelhas.

Indicações: náuseas e vômitos após quimioterapia, náuseas decorrentes de viagens.

11. Bromidrato de escopolamina.....0,25 mg
Solução tampão pH 5.....2,5%
Gel transdérmico PLO qsp qsp.....1 ml
Mande seringas (tipo insulina) calibradas com 1ml, saches monodose ou frasco dosador calibrado (1ml).

Posologia: a critério do profissional habilitado, aplicar 0,1ml 4 horas antes da viagem, de forma tópica no pulso ou atrás da orelha. Reaplicar, se necessário, 6 horas após aplicação inicial.

Indicações: náuseas e vômitos no período pós-operatório, prevenção de enjoos decorrentes de viagens.

12. Bromidrato de escopolamina.....2 mg
Veículo tamponado e isotônico (nasal) qsp qsp.....1 ml

Posologia: a critério do profissional habilitado, aplicar 1 jato via nasal em cada narina 30 minutos antes da exposição ao movimento.

Indicações: prevenção de enjoos de movimento.

13. Ondansetrona cloridrato di-hidratado.....2mg a 8mg
Excipiente qsp.....1 filme orodispersível

Posologia: a critério do profissional habilitado, colocar 1 filme sobre a língua e deixar dissolver. Na prevenção de emese induzida pela quimioterapia; crianças (4-11 anos): 4mg 30 minutos antes da quimioterapia; repetir 4 e 8 horas após a dose inicial e, em seguida, administrar 4mg a cada 8 horas por 1 a 2 dias após término da quimioterapia. Adultos e adolescentes (> 12 anos): 8mg a cada 12 horas, iniciando 30 minutos antes da quimioterapia e continuando por 1-2 dias após o término. Radioterapia, adultos: 8mg 1-2 horas antes da irradiação e, em seguida 8mg a cada 8 horas após primeira dose por 1-2 dia após o término da radioterapia.

Indicações: náusea e vômito induzidos por quimioterapia ou radioterapia.

14. Dimenidrinato.....12,5mg a 50mg
Excipiente qsp.....1 filme orodispersível

Posologia: a critério do profissional habilitado, colocar 1 filme sobre a língua e deixar dissolver a cada 6-8 horas. Crianças (2-5 anos): 12,5mg-25mg a cada 6 a 8 horas (máximo 75mg/dia). Crianças (6-12 anos): 25mg-50mg a cada 6-8 horas (máximo 150mg/dia) e adultos 50-100mg a cada 4-6 horas (máximo de 400mg/dia).

Indicações: tratamento e prevenção de náuseas, vertigem e vômito associados a doenças do movimento, náusea e vômito pós-operatório e de doença de radiação.

15. Cloridrato de metoclopramida.....25mg
Sílica gel micronizada.....15mg
Base graxa qsp.....1 supositório (tamanho infantil)

Posologia: a critério do profissional habilitado, aplicação via retal.

Indicações: antiemético.

Referências bibliográficas

- Batistuzzo, J. A. O; Itaya, M. e Eto, Y. Formulário Médico Farmacêutico, 5ª ed. São Paulo: Atheneu, 2015.
- Martindale: The Complete Drug Reference, 38th Edition, 2014.
- Crespo, M.S e Crespo, J.M.R e S. Formularium: compêndio de fórmulas magistrais, Volume 1. São Paulo: LCM Livraria, 2002.
- Jardim, M.; Souza, V.M e Junior, D.A. A Farmacologia do Suplemento, 2º edição. São Paulo: Daniel Antunes Junior, 2017.
- BRASIL. Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, 2ª ed. Rev. 02. Brasília: Anvisa, 2012.
- Ruiz, K. Nutracêuticos na Prática – Terapias Baseadas em Evidências, 2º edição. São Paulo: Medfarma, 2017.
- Ferreira, A. O. e Souza, G. F. Preparações orais líquidas, 3ª edição. São Paulo: Pharmabooks, 2011.
- Ferreira, A. O.; Brandão, M. A. F. e Polonini, H. C. Guia Prático da Farmácia Magistral, 5ª edição, volume 1. Juiz de Fora: Editar, 2018.
- Material Anfarmag.
- Material do fornecedor Coana.
- Material do fornecedor LEMMA.