

SUGESTÕES DE FORMULAÇÕES

FÍGADO

1. *Cynara scolymus* (Alcachofra) extrato seco.....200mg
Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral 2 vezes ao dia, antes das refeições.

Indicações: adjuvante fitoterápico auxiliar com ação colerética (estimula a secreção da bile e a sua produção hepática) e diurética suave. O seu uso é contraindicado em pacientes com obstrução das vias biliares, hepatite e durante a amamentação (por diminuir a secreção do leite).

2. *Cynara scolymus* (alcachofra) extrato seco.....200mg
Peumus boldus (boldo do Chile) extrato seco.....100mg
Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral 2 vezes ao dia, antes das refeições.

Indicações: adjuvante fitoterápico auxiliar com ação colerética (estimula a secreção da bile e a sua produção hepática) e diurética suave. O seu uso é contraindicado em pacientes com obstrução das vias biliares, hepatite e durante a amamentação (por diminuir a secreção do leite).

3. *Fumaria officinalis* (fumária) extrato seco.....250mg
Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral 2 vezes ao dia, às refeições.

Indicações: adjuvante fitoterápico auxiliar com ação colerética (estimula a secreção da bile e a sua produção hepática) e diurética suave. Também é usada como estimulante do apetite e do aparelho gastrointestinal.

4. Fosfatidilcolina.....300mg
Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral 2 vezes ao dia.

Indicações: tratamento e prevenção da formação de cálculos biliares.

5. Ácido desidrocólico.....100mg
Peumus boldus (boldo do Chile) extrato seco.....100mg
Cynara scolymus (alcachofra) extrato seco.....200mg
 Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral as refeições.

Indicações: adjuvante fitoterápico auxiliar com ação colerética (estimula a secreção da bile e a sua produção hepática). O ácido desidrocólico tem atividade colerética, aumentando o volume e o conteúdo em água da bile, sem alterar, no entanto, a quantidade de ácidos biliares. Tem sido usado também para o alívio temporário da constipação intestinal.

6. Ácido desidrocólico.....100mg
 Metionina.....150mg
Rhammus purshiana (Cáscara sagrada) extrato seco.....100mg
 Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral as refeições.

Indicações: adjuvante fitoterápico auxiliar com ação colerética e laxativa.

7. Extrato fluido de abacateiro.....0,5ml
 Extrato fluido de alcachofra.....0,5ml
 Extrato fluido de boldo.....1ml
 Extrato fluido de cáscara sagrada.....0,1ml
 Extrato fluido de ruibarbo.....0,1ml
 Veículo qsp.....10ml

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 medida de 10ml via oral, de 2 a 3 vezes ao dia.

Indicações: adjuvante fitoterápico auxiliar com ação colerética.

8. Ácido ursodesoxicólico.....150mg a 300mg
 Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, adultos – 150mg a 300mg 2 a 3 vezes ao dia, às refeições; crianças – 5 mg/kg a 15mg/kg ao dia, em doses divididas.

Indicações: profilaxia e tratamento de cálculos biliares de colesterol, cirrose biliar, atresia biliar, colangite esclerosante, cirrose alcoólica, doença hepática colestatia crônica, doença hepática associada com fibrose cística, hepatite crônica, profilaxia da rejeição de transplante de fígado.

9. Silimarina.....150mg
 Excipiente qsp.....1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral 3 vezes ao dia.

Indicações: suplemento com ação hepatoprotetora adjuvante. A metionina vem sendo usada para a prevenção de danos hepáticos nas intoxicações por acetaminofem. A silimarina, princípio ativo obtido dos frutos *Silybum marianum*, vem sendo usado no tratamento dos danos hepáticos causados pelo envenenamento por cogumelos como *Amanita phalloides*.

10. Silimarina.....	100mg
<i>Peumus boldus</i> (boldo do Chile) extrato seco.....	100mg
Metionina.....	200mg
Inositol.....	100mg
Excipiente qsp.....	1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral de 2 a 3 vezes ao dia.

Indicações: suplemento com ação hepatoprotetora adjuvante.

11. Ácido tióctico.....	10mg
<i>Peumus boldus</i> (boldo do Chile) extrato seco.....	100mg
Bromoprida.....	5mg
Simeticone.....	100mg
Metionina.....	200mg
Excipiente qsp.....	1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, 1 cápsula via oral no almoço e no jantar.

Indicações: suplemento com ação hepatoprotetora adjuvante.

12. Bile em pó.....	100mg
<i>Cynara scolymus</i> (alcachofra) extrato seco.....	150mg
Bitartarato de colina.....	150mg
Excipiente qsp.....	1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, tomar 1 cápsula via oral após às refeições.

Indicações: suplemento auxiliar no tratamento da cirrose hepática, como auxiliar do metabolismo de lípidos com ação lipotrófica.

13. DI-metionina.....	150mg
<i>Peumus boldus</i> (boldo do Chile) extrato seco.....	100mg
Pancreatina.....	50mg
Simeticona.....	50mg
Excipiente qsp.....	1 cápsula com revestimento entérico

Posologia: a critério do profissional habilitado, tomar 1 cápsula via oral de 2 a 3 vezes ao dia.

Indicações: suplemento auxiliar no tratamento da cirrose hepática, com ação colerética e hepatoprotetora.

14. Inositol.....	100mg
<i>Peumus boldus</i> (boldo do Chile) extrato seco.....	100mg
Silimarina.....	100mg
DL-metionina qsp.....	500mg

Posologia: a critério do profissional habilitado, tomar 1 cápsula via oral de 2 a 3 vezes ao dia.

Indicações: suplemento auxiliar no tratamento da cirrose hepática, com ação colerética e hepatoprotetora.

15. Bromoprida.....	5mg
DL-metionina.....	80mg
<i>Cynara scolymus</i> (alcachofra) extrato seco.....	100mg
Hidróxido de alumínio.....	80mg
Inositol.....	500mg
Excipiente qsp.....	1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, tomar 1 cápsula via oral 3 vezes ao dia.

Indicações: suplemento auxiliar no tratamento da cirrose hepática, com ação antiácida, colerética, hepatoprotetora e procinética.

16. Ácido dehidrocólico.....	130mg
Bitartarato de colina.....	120mg
<i>Cynara scolymus</i> (alcachofra) extrato seco.....	200mg
Excipiente qsp.....	1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, tomar 1 cápsula via oral 2 vezes ao dia.

Indicações: suplemento auxiliar no tratamento da cirrose hepática, litíase biliar, com ação hepatoprotetora e colelítica.

17. <i>Persea gratissima</i> (abacateiro) extrato seco.....	60mg
<i>Cynara scolymus</i> (alcachofra) extrato seco.....	200mg
<i>Peumuls boldus</i> (boldo) extrato seco.....	150mg
<i>Rhamnus purshiana</i> (cáscara sagrada) extrato seco.....	50mg
<i>Rheum palmatum</i> (ruibarbo) extrato seco.....	100mg
Excipiente qsp.....	1 cápsula

Posologia: a critério do profissional habilitado, tomar 1 cápsula via oral 2 vezes ao dia, às refeições.

Indicações: suplemento auxiliar no tratamento da cirrose hepática, com ação hepatoprotetora.

Referências bibliográficas

- Batistuzzo, J. A. O; Itaya, M. e Eto, Y. Formulário Médico Farmacêutico, 5ª ed. São Paulo: Atheneu, 2015.
- Martindale: The Complete Drug Reference, 38th Edition, 2014.
- Crespo, M.S e Crespo, J.M.R e S. Formularium: compêndio de fórmulas magistrais, Volume 1. São Paulo: LCM Livraria, 2002.
- Jardim, M.; Souza, V.M e Junior, D.A. A Farmacologia do Suplemento, 2º edição. São Paulo: Daniel Antunes Junior, 2017.
- BRASIL. Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira, 2ª ed. Rev. 02. Brasília: Anvisa, 2012.
- Ruiz, K. Nutracêuticos na Prática – Terapias Baseadas em Evidências, 2º edição. São Paulo: Medfarma, 2017.
- Ferreira, A. O. e Souza, G. F. Preparações orais líquidas, 3ª edição. São Paulo: Pharmabooks, 2011.
- Ferreira, A. O.; Brandão, M. A. F. e Polonini, H. C. Guia Prático da Farmácia Magistral, 5ª edição, volume 1. Juiz de Fora: Editar, 2018.
- Material Anfarmag.
- Material do fornecedor Coana.
- Material do fornecedor LEMMA.